Infections materno-fœtales 2022

Clémence BEAURUELLE

Caroline CHARLIER Paris U Paris Cité, CNR Listeria, Hôpital Cochin Port Royal

Cas clinique #1

- Une femme de 36 ans, d'origine brésilienne, arrive de Guyane à 35 SA pour une grossesse non suivie. Elle est hospitalisée en Obstétrique pour des contractions avec un col court 12mm ouvert à un doigt. Pas de fièvre. Examen clinique par ailleurs normal.
- La MAP évolue favorablement, et les sérologies sont prélevées.

Cas clinique #1

- Sérologie Syphilis

- TTPA (Test tréponémique) :1256 U
- Test non tréponémique : 8 U

→ Comment l'interprétez vous?

- A. Infection syphilitique débutante
- B. Cicatrice sérologique d'une infection guérie
- C. Infection syphilitique latente tardive non traitée
- D. Réaction croisée avec une leptospirose guyanaise
- E. Fausse double positivité sérologique (grossesse)

Cas clinique #1

- Sérologie Syphilis

- TTPA (Test tréponémique) :1256 U
- Test non tréponémique : 8 U

→ Comment l'interprétez vous?

A. Infection syphilitique débutante

B. Cicatrice sérologique d'une infection guérie

C. Infection syphilitique latente tardive non traitée

D. Réaction croisée avec une leptospirose guyanaise

E. Fausse double positivité sérologique (grossesse)

Cas clinique #1

TNT peut être retardé par rapport au TT

TNT pas spécifique de *Treponema*
TT pas spécifique de *T. pallidum*

TT + à vie CICATRICE
TNT baisse dans latence
TNT monte si réinfection

Pas de différence infection
Tréponème vénérien
Tréponème non vénérien

Faux doubles positifs sont exceptionnels++++

Cas clinique #1

→ Conduite à tenir ?

Sérologie de contrôle OUI/NON? DELAI SI OUI?

TRAITEMENT OUI/NON? DELAI SI OUI?

Cas clinique #1

→ Conduite à tenir ?

Sérologie de contrôle immédiate

→ Différencier infection ultra précoce / latente tardive

Traitement immédiat

→ IM 2.4M Benzathine pénicilline

→ à renouveler selon stade de l'infection

Syphilis : la pire infection materno fœtale avec Listériose

- **80% issues défavorables de grossesse**
 - **Fausses couches 40%**
 - **Prématurité**
 - **Infection congénitale qui est retardée > 2ans 2/3 cas**

Syphilis : le plus vite le mieux

- **Transmission mère/enfant 3 paramètres**
 - **Anténatale à partir de 16SA et ACCOUCHEMENT**
 - **Infections précoce = spirochétémie > tardive**

Stage	Rate of transmission
Primary/ Secondary (early)	60-100%
Early latent	40%
Late latent	8-10%

Harter AJOG 1976
Fiumara
Clin Obstet Gynecol 1975

- **Traitement maternel idéalement terminé à 16SA et minimum 1 mois avant accouchement**

Carles JGOBR 2008

→ Transmission passe de 75% à 19%

Cas clinique #1

→ Le pédiatre vous demande quelles sont les modalités d'évaluation de l'enfant à la naissance?

Cas clinique #1

→ Le pédiatre vous demande quelles sont les modalités d'évaluation de l'enfant à la naissance?

1. Clinique : rhinorrhée/ sepsis/ SNC/RCIU
2. Sérum couplé mère/enfant (pas sang cordon)
3. (1 cotylédon → CNR pour PCR)

Situation à risque maximal de transmission

Situation à risque nul

Situation à risque minimal

RISQUE	MAX	NUL	MINIMAL
Clin	Signes cliniques	Examen normal	Examen normal
Traitement mat	AUCUN OU MAUVAIS OU < 1mois avant acc	Complet < 16 SA	COMPLET > 1 MOIS
TNT BB	+	-	+
TNT BB/maman	>4	0	<4
IgM BB	+	-	-
PCR BB	+	-	-
CAT	Rx/PL/bio PENI G 10-14j 150.000U/kg/j	RIEN	1 IM Extencilline 50.000 U/kg 1 fois
Surveillance	Séro 2 ans	RIEN	OUI

Cas clinique #2

- 30 septembre 2022
- Nolwenn, 30 ans, sans antécédent G1P0 24 SA consulte aux urgences du service d'obstétrique de Morlaix pour fièvre 38°4 avec quelques douleurs articulaires. L'examen clinique est pauvre.
- Les mouvements actifs foetaux sont perçus.
- Pas de contraction, pas de mise en travail.
- TA 10/6 FC 90/min, température 38°5.
- La bandelette urinaire est négative.

Cas clinique #2

→ L'interne d'obstétrique a prélevé un ECBU et une hémoculture, et demande s'il doit débuter un traitement antibiotique?

- A. Oui
- B. Non
- C. Ne se prononce pas : -)

Cas clinique #2 traitement préemptif de Listériose

→ La fièvre est fréquente pendant la grossesse

→ La fièvre nue est rare! et évocatrice

→ Listériose

→ Infection virale (TORCH? Ou autre): CMV/B19

→ Primo infection toxo

Pas d'adénopathie

Pas d'éruption

Pas de signe ORL/respiratoire

Cas clinique #2 traitement préemptif de Listériose

- La fièvre est fréquente pendant la grossesse
- La fièvre nue est rare! et évocatrice
- La listériose est grave
 - 25% pertes fœtales
 - 45% prématurité
 - 6/7 enfants nés vivants sont infectés

Pas tératogène

- Le traitement maternel réduit la sévérité NN
 - OR 0.06 prélèvement central positif

Cas clinique #2 traitement préemptif de Listériose

- La fièvre est fréquente pendant la grossesse
- La fièvre nue est rare! et évocatrice
- La listériose est grave
- Le traitement maternel réduit la sévérité NN
 - OR 0.06 prélèvement central positif
- Traitement préemptif amoxicilline
 - > 3 g/j > 5 jours

Cas clinique #2

- Nolwenn, 30 ans, sans antécédent G1P0 24 SA
Fièvre nue.
- L'évolution est favorable sous amoxicilline.
- Apyrexie, poursuite de la grossesse.
- Hémoculture négative, ECBU stérile.
Prélèvement vaginal négatif.
- Poursuivons nous l'amoxicilline?

Cas clinique #2

Maternal samples	
Blood	47/85 (55%)
Cervical/vaginal swab	14/54 (26%)
Infant samples	
Placenta	50/64 (78%)
Blood	31/75 (41%)
CSF	10/56 (18%)
Amniotic fluid	8/15 (53%)
Peripheral samples	
Gastric aspirate	52/67 (78%)
Anus	18/26 (69%)
Ear	26/37 (70%)
Pharynx	10/20 (50%)
Other samples†	2/2 (100%)

L'hémoculture a une sensibilité de 55%

La négativité d'une hémoculture ne permet pas d'écarter le dg

Poursuite de l'amoxicilline si pas de diagnostic différentiel

Cas clinique #2

- Nolwenn, 30 ans, sans antécédent G1P0 24 SA
Fièvre nue.
- Place de la sérologie pour le diagnostic rétrospectif?
 - A. Très utile
 - B. Peu utile
 - C. Inutile
 - D. Ne se prononce pas

Cas clinique #2

- Nolwenn, 30 ans, sans antécédent G1P0 24 SA
Fièvre nue.
- Place de la sérologie pour le diagnostic rétrospectif?
 - A. Très utile
 - B. Peu utile
 - C. Inutile**
 - D. Ne se prononce pas

Peu sensible

Peu spécifique

Aucune place dans le dg

Le seul outil de dg de listériose

avant l'accouchement reste l'hémoculture maternelle

Cas clinique #3

- Agathe, née à 34 SA par voie basse, grossesse gémellaire, RPDM 23SA, PV : FC
- J8 : Dégradation clinique
→ Cefotaxime + Gentamicine

→ CRP, hémoculture, PL →

< 5 mg/L
56 mg/L à J9

POSITIVE

Ponction lombaire

EXAMEN DIRECT

Liquide Xanthochromique

Leucocytes

Méthode : Numération au microscope en cellule de Malassez.

8600 /mm³

Hématies

Méthode : Numération au microscope en cellule de Malassez.

133 /mm³

Polynucléaires neutrophiles

69 %

Éléments mononucléés

31 %

Protéïnorrhée : 4.5 g/L

→ Quelle est l'étiologie la plus probable ?

A. *S. agalactiae*

B. *L. monocytogenes*

C. *S. pneumoniae*

D. *E. coli*

E. *N. meningitidis*

Méningites néonatales

- Prévalence stable : 5 / 100 000 naissances (pays développés)
- Etiologie :
 - *S. agalactiae* : 50%
 - *E. coli* : 15%
 - Autres BGN (4%)
 - Autres streptocoques (4%)
 - *N. meningitidis* (3%)
 - *L. monocytogenes* (1.5%)

Streptococcus agalactiae

- Streptocoque du groupe B (SGB)

1887

1938

1960

1990

Médecine vétérinaire

Médecine humaine

Mammite bovine

sporadiques

Nouveau-né

adulte

ARTICLE

Received 20 Feb 2014 | Accepted 27 Jun 2014 | Published 4 Aug 2014 | Updated 28 Jan 2015

DOI: 10.1038/ncomms5544

OPEN

Streptococcus agalactiae clones infecting humans were selected and fixed through the extensive use of tetracycline

Violette Da Cunha^{1,2,3,*}, Mark R. Davies^{4,5,*}, Pierre-Emmanuel Douarre^{1,2}, Isabelle Rosinski-Chupin^{1,2}, Immaculada Margarit⁶, Sebastien Spinali⁷, Tim Perkins⁶, Pierre Lechat³, Nicolas Dmytruk⁷, Elisabeth Sauvage^{1,2}, Laurence Ma⁸, Benedetta Romi⁶, Magali Tichit⁸, Maria-José Lopez-Sanchez^{1,2}, Stéphane Descorps-Declere³, Erika Souche³, Carmen Buchrieser^{2,9}, Patrick Trieu-Cuot^{1,10}, Ivan Moszer³, Dominique Clermont¹¹, Domenico Maione⁶, Christiane Bouchier⁸, David J. McMillan^{12,13}, Julian Parkhill⁴, John L. Telford⁶, Gordan Dougan⁴, Mark J. Walker⁵, The DEVANI Consortium[†], Matthew T. G. Holden^{4,†}, Claire Poyart^{1,7,14,15} & Philippe Glaser^{1,2,3}

Streptococcus agalactiae

- Un pathogène majeur chez le nouveau-né

- Stratégie de prévention :

Dépistage systématique (34 à 38 SA)

- PV, par culture, sans enrichissement
- PCR (HAS 2017)

- Prévalence : 18 % (monde), 10 à 15 % (France)
- Transitoire, intermittent, persistant

→ Antibioprophylaxie per-partum :
diminuer l'inoculum bactérien

Streptococcus agalactiae

- Un pathogène majeur chez le nouveau-né

- Stratégie de prévention :

Dépistage systématique (34 à 38 SA)

- PV, par culture, sans enrichissement
- PCR (HAS 2017)

Méningites néonatales

- Nouveau-né **prématuré** : *E. coli* = **1e cause (risque X 7)**
- Méningites à *E. coli* de l'enfant :
 - Nouveau-né ++ (71%)
 - 2 pics : 0-3 jours [préma]; 11-15j [terme]
- Physiopathologie :

Cas clinique #3

- Agathe, née à **34 SA** par voie basse, grossesse gémellaire, RPDM 23SA, PV : FC
- **J9 : Hémoculture : *E. coli* K1**

Antibiogramme

1 : Escherichia coli

	CM (mg/l)
AMOXICILLINE (25µg)	Résistant
AMOXICILLINE/A.CLAV	Sensible
AMOXICILLINE/A.CLAV (Cystite)	Sensible
TICARCILLINE (75 µg)	Résistant
TICARCILLINE/A. CLAV (75/10µg)	Sensible
PIPERACILLINE (75 µg)	Résistant
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM	Sensible
CEPHALEXINE (30 µg)	Sensible
CEFOTAXIME (30 µg))	Sensible
CEFTRIAZONE (30 µg)	Sensible
CEFTAZIDIME (30 µg)	Sensible
AZTREONAM (30 µg)	Sensible
CEFEPIME (30 µg)	Sensible
IMIPENEME	Sensible
ERTAPENEME (10 µg)	Sensible
TEMOCILLINE	Sensible
GENTAMICINE (15 µg)	Sensible
TOBRAMYCINE (10 µg)	Sensible
AMIKACINE (30 µg)	Sensible
A. NALIDIXIQUE (30 µg)	Sensible
CIPROFLOXACINE (5 µg)	Sensible
LEVOFLOXACINE (5 µg)	Sensible
TRIMETHOPRIME+SULFAMETHOXAZOLE	Sensible

Ponction lombaire

EXAMEN DIRECT

Liquide Xanthochromique

Leucocytes 8600 /mm³
Méthode : Numération au microscope en cellule de Malassez.

Hématies 133 /mm³
Méthode : Numération au microscope en cellule de Malassez.

Polynucléaires neutrophiles 69 %

Éléments mononucléés 31 %

Rares Bacilles Gram négatif

Méthode : Recherche de bactéries par coloration de Gram.

CULTURE

1 - Culture négative à 48h

2 - Culture négative en milieu liquide à 10 jours

BACTERIOLOGIE MOLECULAIRE

Liquide céphalorachidien

PCR "universelle" (ARN 16S)

Résultat Positif

Détection de Escherichia coli

Cas clinique #3

→ Conduite à tenir ?

- PL de contrôle OUI/NON ?

TRAITEMENT ?

- DUREE ? 2 semaines ? 3 semaines ?

- DEXAMETHASONE ?

- CIPROFLOXACINE ?

Méningites néonatales à *E. coli*

- **PL de contrôle** à 48h – 72h

- recommandée / IDSA : conditionne la durée du traitement : 2 semaines après 1^e LCS stérile ou 3 semaines (Tunkel et al; IDSA guidelines 2004)
- Peu fait en pratique devant une bonne évolution clinique

- **Traitement :**

- + **DEXAMÉTHASONE ?**

→ Très peu de données. Pas d'intérêt

- + **CIPROFLOXACINE ?**

→ non

A. S. Daoud · A. Batiha · M. Al-Sheyab · F. Abuckteish · A. Obeidat · T. Mahafza

Lack of effectiveness of dexamethasone in neonatal bacterial meningitis

Table 3 The outcome of neonates with bacterial meningitis in the two study groups

	Total	Died	Normal	Permanent CNS deficit
DM	27	6(22%)	14(70%)	6(30%)
No DM	25	7(28%)	11(61%)	7(39%)

CMI CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION | **ESCMID** EUROPEAN SOCIETY OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES

ORIGINAL ARTICLE | VOLUME 25, ISSUE 8, P1006-1012, AUGUST 01, 2019

Combination therapy with ciprofloxacin and third-generation cephalosporin versus third-generation cephalosporin monotherapy in *Escherichia coli* meningitis in infants: a multicentre propensity score-matched observational study

M. Tazuin · N. Ouldali · C. Lévy · S. Béchet · R. Cohen · L. Caeymaex

Open Archive · Published: December 26, 2018 · DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2018.12.026>

Cas clinique #3

- **Evolution** :

- Pas de PL de contrôle – Claforan 21j
- 9 jours après l'arrêt des ATB – J39 de vie (16/9): dégradation clinique, choc septique

Récidive de la méningite à *E. coli*

- Hémodiculture et PL + à *E. coli* K1
- Claforan + amiklin
- PL de contrôle H48, H96, J19, J25 : culture neg

Case Report

Relapse of Neonatal *Escherichia coli* Meningitis: Did We Miss Something at First?

Nadja H. Vissing ^{1,*}, Mette B. Mønster ¹, Sannie Nordly ², Gholamreza K. Dayani ³, Sofie S. Heedegaard ⁴, Jenny D. Knudsen ⁵ and Ulrikka Nygaard ¹

Méningite à *E. coli* :

- Mortalité : 10%
 - Séquelles : 25- 50%
 - Rechute : 2 à 21 %
- } > préma

Méningites néonatales

Commensal

Janus

Pathogène

**Facteurs d'hôte ?
Facteurs bactériens ?**

Streptococcus agalactiae : phylogénie

- Sérotypage ou typage capsulaire
 - Largement utilisé
 - Antisérums / méthodes moléculaires
 - 10 sérotypes : Ia, Ib, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

IN tardives
méningites
néonatales*

Streptococcus agalactiae : phylogénie

- MLST (Multi Locus Sequence Typing)
 - 1350 ST décrits

Clone ST-17 (CC-17) =
hyper-invasif
IN tardives –
Méningites néonatales

Manning et al. 2009

The Journal of Clinical Investigation

RESEARCH ARTICLE

CC17 group B *Streptococcus* exploits integrins for neonatal meningitis development

Romain Deshayes de Cambronne,¹ Agnès Fouet,¹ Amandine Picart,¹ Anne-Sophie Bourrel,^{1,2} Cyril Anjou,¹ Guillaume Bouvier,³ Cristina Candeias,¹ Abdelouhab Bouaboud,¹ Lionel Costa,¹ Anne-Cécile Boulay,⁴ Martine Cohen-Salmon,⁴ Isabelle Plu,⁵ Caroline Rambaud,⁶ Eva Faurobert,⁷ Corinne Albigès-Rizo,⁷ Asmaa Tazi,^{1,2,8} Claire Poyart,^{1,2,8} and Julie Guignot¹

Adhésines spécifiques de
ST17 (Srr2)

Intégrines ($\alpha 5\beta 1$, $\alpha v\beta 3$)
surexprimées en périodes néonatales
dans les vaisseaux cérébraux de la BHE

E. Coli : phylogénie

- Espèce clonale, transfert horizontaux (plasmides, PAI)
- 8 Groupes phylogénétiques (B2)
- Serotype : Somatique (LPS) (Ag O), Capsulaire (K), Flagellaire (H)
- MLST : STc 95

018:K1:H7 clone historique mondiale
045s88:K1:H7 et O1:K1:H7
(France, 25% des isolats 2004-2015) :
plasmide ps88 like (sidérophores)

Strains	141
<i>E. coli</i> phylogenetic group or subgroup	
A	7 (5.0)
B2 (not B2.1)	31 (22.0)
B2.1	79 (56.0)
D	24 (17.0)
O serogroup	
O1	39 (27.7)
O18	27 (19.1)
O45	16 (11.3)
O7	9 (6.4)
O2	5 (3.5)
O6	4 (2.8)
O16	4 (2.8)
O83	3 (2.1)
Uncommon ^d	34 (24.1)
Virulence determinants ^{b,e}	
K1 antigen ^f	207/42 (83.1)

Antigène capsulaire K1 similaire à celui de
N. meningitidis groupe B.

E. Coli : phylogénie

- Espèce clonale, transfert horizontaux (plasmides, PAI)
- 8 Groupes phylogénétiques (B2)
- Serotype : Somatique (LPS) (Ag O), Capsulaire (K), Flagellaire (H)
- MLST : STc 95

018:K1:H7 clone historique mondiale
045s88:K1:H7 et O1:K1:H7
(France, 25% des isolats 2004-2015) :
plasmide ps88 like (sidérophores)

**Aucun facteur de virulence suffisant pour
expliquer la physiopathologie des
méningites néonatales à *E. coli***

**Facteurs d'hôte ?
Microbiote ?**

Strains	141
<i>E. coli</i> phylogenetic group or subgroup	
A	7 (5.0)
B2 (not B2.1)	31 (22.0)
B2.1	79 (56.0)
D	24 (17.0)
O serogroup	
O1	39 (27.7)
O18	27 (19.1)
O45	16 (11.3)
O7	9 (6.4)
O2	5 (3.5)
O6	4 (2.8)
O16	4 (2.8)
O83	3 (2.1)
Uncommon ^d	34 (24.1)
Virulence determinants ^{b,e}	
K1 antigen ^f	207/42 (83.1)

> Cell Rep. 2021 Jun 29;35(13):109319. doi: 10.1016/j.celrep.2021.109319.

Neonatal susceptibility to meningitis results from the immaturity of epithelial barriers and gut microbiota

Laetitia Travier ¹, Mariana Alonso ², Alessio Andronico ³, Lukas Hafner ⁴, Olivier Disson ¹, Pierre-Marie Lledo ², Simon Cauchemez ³, Marc Lecuit ⁵

Take home messages

Infections materno-fœtales

- Suspicion listériose → maintenir amoxicilline si pas de dg alternatif
- Jamais de sérologie Listeria
- Syphilis → traiter avant 16 SA et dépister le NN par TNT BB/maman

Infections néonatales

1

Dépistage systématique
Sérotype III, ST-17
Amoxicilline

2*

*1
Préma

Cefotaxime + gentamicine
Corticoides, FQ : pas d'intérêt
Risque de récidence

MERCI DE VOTRE ATTENTION