Atlanta – mars 2013

COMPTE RENDU DE LA CROI 2013

Un pas en arrière, deux pas en avant...

Epidémiologie et transmission

Qualité de la prise en charge

- « Cascade de la prise en charge »

Cascade de la prise en charge en France en 2010 (1)

Journée annuelle du COREVIH-Bretagne – 18 avril 2013

Cascade en France vs Etats-Unis

Cascade de la prise en charge en France en 2010 (2)

Engagement dans la prise en charge VIH par groupe de transmission

Répartition des 28 800 personnes infectées non diagnostiquées

Essai « VOICE »

- Un grand espoir déçu

Essai Voice

- Contraception efficace
 - 8% de grossesses...
- Gel et ténofovir seul
 - Inefficacité précoce
- Final
 - Rien de vraiment efficace : problème d'observance

	TDF p.o.*	Placebo p.o.*	FTC/TDF p.o.	Placebo p.o.	TFV gel	Placebo gel
Incidence VIH/100 a-p (IC 95 %)	6,3 (4,7 ; 8,3)	4,2 (2,9 ; 5,8)	4,7 (3,6 ; 6,1)	4,6 (3,5 ; 5,9)	5,9 (4,5 ; 7,6)	6,8 (5,3 ; 8,6)
RR vs placebo (IC 95 %)	1,49 (0,97 ; 2,3)		1,04 (0,7 ; 1,5)		0,85 (0,6 ; 1,2)	

Nouvelles technologies au secours de la prévention ? Et de l'observance...

- GSK1265744 LAP, forme particulière d'inhibiteur d'intégrase
 - Chez le macaque, inoculation rectale
 - Protection > 4 mois ?
- Anneau intravaginal de ténofovir
 - Chez le macaque, anneau changé mensuellement, délivrance 2,4 mg/j
 - Inoculation tous les mois

Risque d'acquisition du VIH après une IST

- Réseau de surveillance des IST et du VIH en Floride
- Janvier 2000 – Décembre 2009, recensement chez les personnes âgées de 13 à 59 ans
 - *Chlamydia* (n = 257 347),
 - Gonocoque (n = 67 784)
 - Syphilis (n = 3 325)
 - Syphilis (n = 161 498) chez les hommes (73 % HSH)
- Recherche infection VIH ultérieure
 - 0,3 à 1,6 % par année-personne : femmes/syphilis et femmes noires > 20 ans/gonocoque
 - Les hommes avec syphilis ont un risque de contracter le VIH de **21 % à 8 ans**

} Femmes

21 % à 8 ans

Le réduire, le réduire... !

LE RESERVOIR

Qui n'a pas entendu parler du bébé miracle ?

- Comment transformer un **triple échec de prise en charge**
 - Mère non suivie
 - diagnostiquée au moment de l'accouchement mais non traitée
 - Enfant perdu de vue après quelques mois de suivi...
- ... en succès médiatique ?

Primo-infection, toujours la même interrogation : traiter ou ne pas traiter ?

- Essai chez 68 patients en primo-infections précoces
 - Début du traitement : J+2 ou J+3
 - Plus le traitement est débuté précocement, moins le réservoir constitué est important

Traitement très précoce
Traitement précoce

●
▲

n :
n :

S0 S24
4 4
8 8

Des certitudes, des interrogations

Mère – enfant

COHORTE PERINATALE FRANÇAISE (EPF)

- **Contexte**
 - Efavirenz
 - 1998 : anomalies du tube neural chez le rat
 - 2011 : méta-analyse, pas d'association (*Ford, AIDS 2011*)
 - 2012 : EFV conseillé pendant T1 de la grossesse (OMS, DHHS)
 - Zidovudine : anomalies congénitales cardiaques
- **Objectif** : analyse systématique du lien entre différentes anomalies congénitales et l'exposition aux différents ARV
- **Méthode**
 - Anomalies congénitales
 - Considérées dans leur ensemble et par organe/système
 - Exposition pour chaque ARV selon le trimestre de la grossesse

COHORTE PERINATALE FRANÇAISE (EPF) : 13 124 naissances

Efavirenz (372 enfants exposés pendant le 1^{er} trimestre)

	Toutes anomalies congénitales			Anomalies du SNC		
	ORa	IC 95 %	p	ORa	IC 95 %	p
Efavirenz						
Non exposés	1			1		
1 ^{er} trimestre	1,3	(0,9-1,9)	0,31	3,2	(1,1-9,1)	0,03
2 ^{ème} -3 ^{ème} trimestre	1,2	(0,1-8,3)		NA		

4 anomalies du SNC : pachygyrie, agénésie des corps calleux, hydrocéphalie, kyste cérébral

Zidovudine (3 267 enfants exposés pendant le 1^{er} trimestre)

	Toutes anomalies congénitales			Anomalies cardiaques		
	ORa	IC 95 %	p	ORa	IC 95 %	p
Zidovudine						
Non exposés	1			1		
1 ^{er} trimestre	1,4	(1,1-1,8)	0,002	2,5	(1,6-4,2)	0,001
2 ^{ème} -3 ^{ème} trimestre	1,1	(0,9-1,4)		1,6	(0,9-2,6)	

COHORTE PERINATALE FRANÇAISE (EPF)

- Autres ARV
 - Didanosine (927 expositions)
 - Anomalies de la tête et du cou : ORa : 1,93 (1,1-3,4) ; $p < 0,05$
 - Lamivudine (3 772 expositions)
 - Anomalies musculosquelettiques : ORa : 1,40 (1,1-1,94) ; $p = 0,04$
 - Anomalies de la tête et du cou : ORa : 1,96 (1,2-3,2) ; $p = 0,03$
- Commentaires
 - Les anomalies congénitales n'ont été analysées que sur les naissances vivantes
 - L'exposition à d'autres médicaments n'a pas été prise en compte
 - Les anomalies du SNC observées sous efavirenz ne sont pas des anomalies congénitales du tube neural
 - L'association entre anomalies congénitales cardiaques et exposition à zidovudine est forte mais le mécanisme physiopathologique inconnu

Perfusion de rétrovir au moment de l'accouchement

- Etude dans la cohorte **ANRS EPF CO1-CO11**
- 11 538 dossiers analysés
 - 10 984 femmes ont reçu ZDV i.v. per partum
 - 644 femmes n'ont pas reçu ZDV i.v. per partum
 - CV VIH indétectable

Taux de transmission du VIH (%)

Ça se précise...

INFECTIONS OPPORTUNISTES

Peut-on mieux traiter la tuberculose ,

- Résumé des épisodes précédents
 - Il ne faut pas commencer trop tôt
 - Il ne faut pas commencer trop tard
- Mais avec quoi ?
 - Essai REFLATE
 - TDF/3TC et Efavirenz ou Raltegravir (800 ou 1 600 mg/j)

Il faut commencer les anti-VIH 15 jours après les antituberculeux si le patient est très immunodéprimé

Caractéristiques initiales	EFV 600 qd (n = 51)	RAL 400 bid (n = 51)	RAL 800 bid (n = 51)
Résultats			
CV < 50 c/ml	67 %	76 %	63 %
Echec virologique	22 %	20 %	22 %
Evénements indésirables conduisant à l'arrêt des ARV	n = 3 6 %	0	n = 3* 6 %
Guérison de la tuberculose	88 %	90 %	88 %

Peut-on mieux traiter la cryptococcose ?

- Résumé des épisodes précédents
 - Maladie du déficit immunitaire sévère
 - Décès +++ au cours du 1^{er} mois
 - Risque d'IRIS mortel
- Etude COAT : 177 patients
- ARV immédiat Vs « après 4 semaines »
 - Ne pas traiter trop tôt (4 semaines ?)
 - Ne pas traiter tôt si LCR peu inflammatoire
 - Attendre stérilisation du LCR
 - ... et toujours penser aux PL soustractives

Survie globale

On avance avec certitude... vers la simplification

ESSAIS CLINIQUES VIH

En résumé des essais cliniques

- Tipi : essai de traitement précoce intermittent (6 mois/6mois)
 - Pas de bénéfice évident, ni d'inconvénient
 - 30 % d'arrêt de stratégie
 - Nombre d'IST élevé... 44 patients, 8 IST et une hépatite C aiguë !
- Intensification par le Maraviroc
 - Patients en succès viro mais « échec immuno »
 - Renforcement maraviroc ou placebo
 - Pareil...
- Epargne de nucléoside : RoCnRal
 - Switch vers bithérapie raltegravir + maraviroc (44 patients) chez des patients en succès
 - Essai arrêté : nombre trop élevé d'échecs virologiques

Essais cliniques suite

- Peut-on se passer des analogues nucléosidiques en traitement de sauvetage ?

– Essai « OPTIONS »

C'est la crise...

- Comment faire des économies
 - Pourquoi ne pas regrouper les plasmas et tester en « pool »
 - La Cv de l'ensemble est indétectable : tous indétectables
 - La CV de l'ensemble n'est pas indétectable : on reprends les échantillons individuellement
- MSF l'a fait au Malawi
 - 25 à 50% de tests économisé (en fonction du seuil de CV)
- Les coréens l'on fait en Corée du Sud
 - 17 000 \$ d'économie pour 150 patients suivis 10 mois

P. Pannus et al. # 612

H. Kim et al. # 611

Nouvelles trithérapies

- Stribild (tenofovir, emtricitabine, elvitegravir, cobicistat)
 - Efficacité
 - Idem atripla[®]
 - Idem truvada[®] + reyataz[®] + norvir[®]
 - Tolérance
 - Augmentation « physiologique » de la créatininémie
- Nouvelle anti intégrase
 - Dolutegravir versus raltégravir en « sauvetage » (essai SAILING)
 - Tolérance identique
 - Dolutegravir un peu mieux que raltégravir ? (mais analyse intermédiaire)

A. Zolopa et al. # 553 – A. Pozniak # 179LB

La révolution !

TRAITEMENT DU VHC ET DE LA CO- INFECTION

Essais de nouvelles associations anti-VHC sans PEG-IFN chez des mono-infectés VHC de génotype 1

	Etude M12-267 Etude M12-746 (1)	AVIATOR sous-analyse (2)	ELECTRON avec ajout RBV (3)	COSMOS (4)
Association anti-VHC	<ul style="list-style-type: none"> • ABT-450/r (IP/r) • ABT-072 (INN) pour étude M12-267 ou ABT-333 (INN) pour M12-746 • RBV 	ABT-450 (IP/r) + ABT-333 (INN) + ABT-267 (NS5A) + RBV	SOF (IN) + LDV (NS5A) + RBV	SOF (IN) + SMV (IP) avec ou sans RBV
Durée	12 semaines	8, 12, 24 semaines	12 semaines	12 ou 24 semaines
Patients étudiés et réponses	<p>Naïfs</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABT-072 (n = 11) RVS₂₄ = 91 % • ABT-333 (n = 33) RVS₂₄ = 94 % <p>Non répondeurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABT-337 (n = 17) RVS₂₄ = 47 % 	<p>Naïfs et non répondeurs</p> <p>RVS₁₂ = 85 - 97 %</p> <p>Sous-analyse sur 264 sujets</p> <p>Risque de rechute lié à durée : durée optimale de 12 semaines</p>	<p>Naïfs</p> <p>RVS₁₂ = 100 % (25/25)</p> <p>Non répondeurs</p> <p>RVS₁₂ = 100 % (9/9)</p> <p>Pour rappel (Gane, NEJM 2013)</p> <p>SOF + RBV : RVS₂₄ naïfs = 84% (21/25) NR = 10 % (1/10)</p>	<p>Non répondeurs</p> <p>Premiers résultats sur cohorte 1 (F0-F2)</p> <p>RVS₈ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOF + SMV + RBV = 96 % (26/27) • SOF + SMV = 93 % (13/14) <p>2 rechutes précoces</p> <p>Anémie que avec RBV</p> <p>Hyperbil liée à SMV</p>

IN : inhibiteur nucléotidique; IP : inhibiteur de protéase VHC NS3/4A; NN : inhibiteur non nucléosidique polymérase VHC NS5B; r : ritonavir; RBV : ribavirine; NS5A : inhibiteur de NS5A; SOF : sofosbuvir (GS-7977); LDV : ledipasvir (GS-5885); SMV : siméprévir

(1) Lawitz E, Abs. 38 ; (2) King M, Abs. 39 ; (3) Gane E, Abs. 41LB ; (4) Lawitz E, CROI 2013, Abs. 155LB

Coopération internationale et COREVIH

L'une de nos nombreuses missions...

CIRCULAIRE N°DHOS/DGS/ du 27 novembre 2005 relative à l'instauration des coordinations régionales de la lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine.

• Les trois missions des COREVIH sont de :

- favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique, paraclinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, des actions de coopération internationale, de la formation et de l'information, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;
- participer à l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation et à l'harmonisation des pratiques ;
- mener l'analyse des données médico-épidémiologiques relatives aux patients séropositifs par le VIH suivis à partir de 1991 (cohorte DMI2).

VIH : Coopération internationale hospitalière en Bretagne

- A travers le le GIP Esther
 - Niger/Agadez et CH de St Brieuç
 - Cambodge/Siem Reap et CHU de Brest
 - Côte d'Ivoire/Dabou et CH de Vannes
 - Burundi et CHU de Rennes

Quelle valeur ajoutée ?

Les « moins »

- Pas beaucoup d'argent...
- Une coopération « éparpillée »
 - Pays d'intervention
 - Thématiques

Les « plus »

- Le COREVIH
 - Fait travailler ensemble des équipes hospitalières qui se connaissent et qui s'apprécient
 - Promeut un travail régulier associations/hospitaliers... comme au sud
- Des socles communs peuvent être trouvés
 - Hygiène hospitalière
 - Formation
 - ...
- Des métiers spécifiques au COREVIH
- Un début
 - Projet « Tuberculose » au Burundi avec le CH de St Malo
 - Convention inter hospitalières

La question

Comment avancer vers des projets communs à l'ensemble des acteurs du COREVIH ?