Actualités Virologiques

LUBEM EA 3882 - UFR Médecine, Brest
Christopher Payan

Le 15 mai 2012

Actualités VIH 2011-2012

COINFECTION VIH-VHC

BMS - Rennes

Actualités Virologiques – Coinfection VHC-VIH et nouveaux traitements

Plan:

- Bilan de la bithérapie PegRiba chez le patient coinfecté
- Apport des nouveaux traitements (chez le mono-infecté VHC, chez le coinfecté ?)
- Interaction avec les HAART.
- Perspectives.

Coinfection HIV and Hepatitis C and protease inhibitors

Références PubMed = 104 sur 3 ans (2010-2012)

Exploitations: 26 abstracts, sélection 10 articles

VHB, VHC et VIH : tendances de mortalité aux USA

Analyse des certificats de décès de 1999 à 2007 = 21,8 millions

Co-facteurs associés à la mortalité chez les patients VHC et VHB :

- Maladies chroniques du foie (OR : 32,1 et 34,4)
- Co-infections avec une autre hépatite virale (OR : 29,9 et 31,5)
- Alcool (OR : 4,6 et 3,7)
- Co-infection VIH (OR : 1,8 et 4,0)

Augmentation du taux de mortalité dû au VHC vs VIH et VHB: traitement?

Coinfection VHC-VIH et traitements <2011

Essai Pegylated interferon (PEG-IFN 1x/sem) + ribavirine vs standard interferon (IFN 3x3 MUI/sem) + Rb :

ANRS HC02 RIBAVIC (n=412) SVR = 27% vs 20% (G1,4=20%, G2,3=50%)

Carrat F, Bani-Sadr F, Pol S, *et al.* Pegylated interferon alfa-2b versus standard interferon alfa-2b, plus ribavirin, for chronic hepatitis C in HIV-infected patients: a randomized controlled trial. *JAMA* 2004; **292**: 2839-2848.

AIDS Clinical Trial Group (ACTG) 5071 (n=133) SVR = 27% vs 12%

Chung R, Andersen J, Volberding P, *et al.* Pegylated interferon alfa-2a plus ribavirin versus interferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C in HIV co-infected persons. *N Engl J Med* 2004; **351**: 451-459.

AIDS Pegasys Ribavirin International Coinfection Trial (APRICOT) (n=860) SVR = 40% vs 12%

Torriani FJ, Rodriguez-Torres M, Rockstroh J, *et al.* PEG-Interferon alfa-2a plus ribavirin for chronic HCV infection in HIV-infected patients. *N Engl J Med* 2004; **351**: 438-450.

Chez Mono-infecté SVR = 55% vs 30%.

Manns MP, McHutchison J, Gordon SC, *et al.* Peginterferon a2b plus ribavirin compared with interferon a2b plus ribavirin for initial treatment of chronic hepatitis C: a randomised trial. *Lancet* 2001; **358**: 958-965.

Fried M, Shiffman M, Reddy R, *et al.* Peginterferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection. *N Engl J Med* 2002; **347**: 975-982.

-15 à 25% de SVR en moins chez les patients coinfectés traités PegIFN-Rb

Viral response kinetics to PegIFN+Ribavirin in HIV-HCV coinfectd patients (ANRS RIBAVIC)

Payan et al. GUT 2007

N=159 patients (groupe PegIFN+Rb)

Cinétique virale sous traitement PegIFN+Ribavirine (patients mono-infectés)

SVR=85%

Zeuzem et al. J Hepatol 2005;43: 250-257

Directly acting antivirals against hepatitis C virus

Vincent Soriano*, Eugenia Vispo, Eva Poveda, Pablo Labarga, Luz Martin-Carbonero,
Jose Vicente Fernandez-Montero and Pablo Barreiro

Department of Infectious Diseases, Hospital Carlos III, Madrid, Spain

*Corresponding author. Tel: +34-91-4532500; Fax: +34-91-7336614; E-mail: vsoriano@dragonet.es

- **Inhibiteurs de protéase NS3/4A**
 - Telaprevir (Incivo, JanssenTibotec)
 - Boceprevir (Victrelis, MerckSchering)
 - Danoprevir (Merck)
 - Vaniprevir (Immunogen)
- **Inhibiteurs nucléos(t)idique de polymérase**
 - RG7128 (Genentech/Roche)
 - IDX184 (Idenix)
 - PSI-7977 (Pharmasset)
 - PSI-938 (Pharmasset)
- **Inhibiteurs non nucléos(t)idique de polymérase**
 - Tegobuvir (Gilead)
 - Filibuvir (Pfizer)
 - ANA598 (Anadys)
 - B1207127 (Boehringer)
 - ABT-333 (Abbott)
 - VX-222 (Vertex)
- **Inhibiteurs NS5A**
 - BMS-790052
- **Inhibiteurs cyclophyliline**
 - Alisporivir (Novartis)

SYSTÈME
REPLICON
VHC

Bartenschlager J. Virol 2001

2 classes d'IP anti-VHC

- **Linéaires**
 - Telaprevir
 - Boceprevir
- **Macrocycliques**
 - Vaniprevir (MK-7009)
 - Danoprevir (IMN 191/RG7227)

SERINE
PROTEASE

AMM IP anti-VHC 2011

3 prises PO par jour
Métabolisme hépatique CYP450 3A4
Drug interaction?

Boceprevir (Victrelis)

Telaprevir (Incivo)

Durée selon patients naïfs ou pré-traités
Cirrhose ou non.

Que chez les patients HCV génotype 1

Interactions PK réciproques entre IP/r et bocéprévir (BOC)

Hulskotte E, CROI 2012, Abs. 771LB

Résultats d'interactions PK entre BOC et IP/r

IP/r	BOC → IP/r (C_{min})	IP/r → BOC (C_{min})
ATV/r	↘ 49 %	↔
DRV/r	↘ 59 %	↘ 32 %
LPV/r	↘ 43 %	↘ 45 %

- idem avec le TELAPREVIR/ éviter l'association des IP.
- effet de l'EFV sur le BOC (baisse C_{min} de 44%) et sur le TEL (47%);
- augmenter les dose sous EFV?
- pas d'interaction avec le RAL.

Phase III des IP anti-VHC G1 mono-infectés 2009-2011

Soriano V J Antimicrob Chemoth 2011

Naifs

Boceprevir (Victrelis)
+PR:PegIFN2b+Rb

RESPOND-235

Prétraités

Telaprevir (Incivo)
+PR:PegIFN2a+Rb

REALIZE-30

Amélioration de la SVR +30% avec réduction de la durée de S48 à S24.

Phase III des IP anti-VHC G1 coinfectés VIH 2012

Naifs

Figure 2. Higher percent hepatitis C virus (HCV) undetectable in human immunodeficiency virus (HIV)/HCV coinfecting persons taking boceprevir (BOC), peginterferon (Peg), and ribavirin (RBV) compared to Peg/RBV and placebo [4].

Boceprevir (Victrelis)
+PR:PegIFN2b+Rb

Provisional Guidance on the Use of Hepatitis C Virus Protease Inhibitors for Treatment of Hepatitis C in HIV-Infected Persons

David L. Thomas,¹ John G. Bartlett,¹ Marion G. Peters,² Kenneth E. Sherman,³ Mark S. Sulkowski,¹ and Paul A. Pham¹

¹Department of Medicine, Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, Maryland; ²Department of Medicine, University of California, San Francisco School of Medicine; and ³Department of Medicine, University of Cincinnati School of Medicine, Ohio

In May 2011, hepatitis C virus (HCV) protease inhibitors (PIs) were approved by the US Food and Drug Administration to treat persons with genotype 1 chronic hepatitis C virus (HCV) infection, but not those dually infected with human immunodeficiency virus (HIV). Although critical safety and efficacy data are lacking, the availability of the drugs and substantial medical need justify the off-label use of HCV PIs in select HIV/HCV-coinfecting persons. Pending results of ongoing investigations, this article represents provisional guidance on the use of HCV PIs in HIV-infected persons.

Figure 1. Higher percent hepatitis C virus (HCV) undetectable in human immunodeficiency virus (HIV)/HCV coinfecting persons taking telaprevir (TVR), peginterferon (Peg), and ribavirin (RBV) compared to Peg/RBV and placebo [3, 12].

Telaprevir (Incivo)
+PR:PegIFN2a+Rb

Amélioration de la SVR +30% avec réduction de la durée de S48 à S24..

Télaprécier chez les patients co-infectés VIH-VHC (étude 110)

ARN VHC indétectable 12 semaines après la fin du traitement (%)

Télaprévir chez les patients co-infectés VIH-VHC (étude 110): Tolérance

Dieterich D, CROI 2012, Abs. 46

Événements indésirables d'intérêt particulier

	TVR + PR (n = 38) n (%)	PR (n = 22) n (%)
→ Prurit	15 (39 %)	2 (9 %)
Céphalées	14 (37 %)	6 (27 %)
Nausées	13 (34 %)	5 (23 %)
Eruption sévère	0 (0 %)	0 (0 %)
→ Eruption minime ou modérée	13 (34 %)	5 (23 %)
Fièvre	8 (21 %)	2 (9 %)
Dépression	8 (21 %)	2 (9 %)
Anémie	7 (18 %)	4 (18 %)
Hémoglobine grade 3 (7,0 - 8,9 g/dl)	11 (29 %)	5 (23 %)
Utilisation d'EPO	3 (8 %)	1 (5 %)
Transfusion sanguine	4 (11 %)	1 (5 %)

Diminution des CD4 dans les 2 groupes mais le % des CD4 reste inchangé.

Bocéprévir chez les co-infectés VIH-VHC génotype 1 naïfs

Sulkowski M, CROI 2012, Abs. 47

Réponse virologique (analyse intermédiaire : SVR 12) *

La réponse SVR12 est identique (67 %) dans le bras PR + BOC pour les patients traités par ATV/r (12/18), LPV/r (10/15), DRV/r (8/12) et de 43 % pour RAL (3/7)

Bocéprévir chez les co-infectés VIH-VHC génotype 1 naïfs: Tolérance

Sulkowski M, CROI 2012, Abs. 47

	PR (n = 34)	PR + BOC (n = 64)
Arrêts pour événements indésirables	3 (9 %)	13 (20 %)
Événements indésirables fréquents avec différence > 10 % entre les bras		
Anémie	26 %	41 %
Fièvre	21 %	36 %
Asthénie	24 %	34 %
Anorexie	18 %	34 %
Diarrhée	18 %	28 %
Dysgueusie	15 %	28 %
Vomissements	15 %	28 %
Syndrome pseudo-grippal	38 %	25 %
Neutropénie	6 %	19 %

SPRINT 1: Boceprevir chez le patient naif et SVR selon réponse S4 (RVR)

AASLD 2009 – Kwo P., États-Unis, Abstract 62

P/R S4 → P/R/BOC S24

P/R S4 → P/R/BOC S44

Réduction HCV RNA Log₁₀ après 4 semaines de PegIFN 2b-Rb

**Il faut obtenir plus de 1 log de réduction à S4
sinon risque d'échec à 55%: résistance ?**

Clinical Relevance of Detectable but Not Quantifiable Hepatitis C Virus RNA during Boceprevir or Telaprevir Treatment

Hepatology. 2011 Nov 16.

Patrick R. Harrington^{1*}, Wen Zeng², and Lisa K. Naeger^{1*}

Dans ADVANCE REALIZE et SPRINT2, la SVR était définie comme < LLOQ (détectable ou indétectable à 24 ou 12 S post traitement): **IMPACT sur la SVR?**

% HCV RNA détectable mais non quantifiable sous IP ou BLOQ

BLOQ below the lower limit of plasma HCV RNA quantification

Harrington et al, Hepatology 2011

20 à 30% détectable, au moment clé (S4) de la décision, SVR ?

SVR et détectabilité sous IP

SPRINT 2, BOC naïf

REALIZE, TEL pré traité

Harrington et al, Hepatology 2011

Tous bras confondus, le fait d'avoir eu une PCR VHC détectable/BLLOQ est associé à une diminution du taux de SVR (-20 à 50%):
ECHEC et RESISTANCE?

Evolution des mutations au cours de la trithérapie PR+TEL

Sarrazin C et al. Gastroenterology 2007

Mutations de résistance aux IP 6 positions majeures dans NS3

- 36
- 54
- 155
- 156
- 168
- 170

Protéase (Serine) du VHC
 NS3 (bleu)-NS4a (jaune)

Protéase (Asp) du VIH

Résistances croisées IP anti-VHC

	V36A/M	T54S/A	V55A	Q80R/K	R155K/T/Q	A156S	A156T/V	D168A/V/T/H	V170A/T
Telaprevir (linear)			*						*
Boceprevir (linear)							*		
SCH900518 (linear)									
BILN-2061 ** (macrocylic)									
ITMN191/R7227 (macrocylic)						*	*		
MK-7009 (macrocylic)									
TMC435350 (macrocylic)									
BI-201335 (macrocylic?)									

* Mutations associated with resistance in vitro but not described in patients so far

** Mutations associated with resistance in vitro

Mutation R155K/T/Q de classe.

Mutation, résistance et fitness

Sarrazin C et al. Gastroenterology 2007

*évaluation sur système réplicon

Disparition des mutations de résistance au TVR après l'arrêt.

Sullivan J. et al. EASL 2011.

Disparition des mutations de résistance au TEL après l'arrêt.

Les GT 1b retrouvent plus rapidement leur souche sauvage d'origine que les GT 1a ce qui sous-tend une capacité répliquative moindre des mutants 1b.
 AUTRES GENOTYPES ?

Mutant R155K et sous-type 1a et 1b du VHC

Sarrazin C et al. Gastroenterology 2010

NS3 protease amino acid sequence

Residue	Mutatio	NS3 protease Inhibitors	G1 (61)	G2 (32)	G3 (38)	G4 (36)	G5 (23)
V36	A,ML,G	TEL, BOC	V36L 3%(2/61) V36I 1.6%(1/61)	100% V36L	100% V36L	100% V36L	100% V36L
Q41	R	BCV, ITMN					Q41H 4%(1/23)
F43	S/C	TVR, BCV, ITMN					
T54	A/S	TEL, BOC	T54S 5%(3/61)			T54S 5.5%(2/36)	
V55	A/I	BOC	V55I 3%(2/61)				
Q80	K/R	TMC435	Q80K 6.5%(4/61) Q80L 3% Q80R 1.6%(1/61)				
R155	K/T/I/M/G/ L/S/Q	TEL, BOC, ITMN	R155K 1.6%(1/61)				
A156	S/T/M	TEL, BOC, ITMN					
V158	I	BCV		V158I 3%(1/32) V158X 3%(1/32)			V158L 1%(1/23) V158M 4%(1/23)
D168	A/V/E	ITMN			100% D168Q		D168E 43.5%(10/23)
V170	A	TEL, BOC	V170A 62%(38/61) V170V 34%(21/61) V170W 1.6%(1/61) V170T 1.6%(1/61)	V170Y 4%(30/32)	V170I 97%(37/38)	V170I 5.5%(2/36)	100% V170I

Séquençage direct
(seuil 20%)

Polymorphisme et faible résistance du HCV G2,3,4,5 au Telaprevir et Boceprevir

Idem chez coinfectés

Trevino et al, Antiviral Ther. 2011
Trimoulet et al, HIV med 2011

Vallet et al, Antiviral Ther 2011

NS3 protease Polymorphism

PIs pocket

Vallet et al, Antiviral Ther 2011

Essai traitement HCV Génotypes 2, 3, 4, phase IIa

Génotype 2: SVR Tel seul=56%, Tel+PR=100%, PR=89%

Génotype 3: SVR Tel seul=50%, Tel+PR=67%, PR=44%

Génotype 4: SVR Tel seul=63%, Tel+PR=50%, PR=63%

Chez coinfecté VIH-VHC
Géno1a, 3 et 4 majoritaire.

Foster et al, EASL, Vienne 2010
Benhamou et al, AASLD, Boston 2010

Payan et al J. Viral Hep. 2005

Perspective

- Nouvelles combinaisons thérapeutiques
- Antipolymérase, antiprotéases et PR.
- Apport des anti-NS5a?
- Contribution de la ribavirine?
- Fin de l'interféron?
- Durée plus courte?

Novel Therapies Currently in Trials

Antipolymérase et autres DAAs anti-VHC

A

Soriano V. et al. JAC 2011

B

Sarrazin C et al. Gastroenterology 2010

	S96T	S282T	C316Y /N	S365T/ A	M414T /L	L419M /V	M423T /V	Y448C /H	M82L/ V/T	V494I/ A	P495S/L/ A/T	P496A /S	V499A	G554D	D559G
NM283 ** (nucleoside)		■													
R7128 ** (nucleoside)		■													
R1626 ** (nucleoside)	■														
BILB1941 ** (NNI-site 1)										■	■	■	■		
BI207127 ** (NNI-site 1)										■	■	■	■		
GS9190 ** (NNI-site 1)										■	■	■	■		
Filibuvir * (NNI-site 2)										■	■	■	■		
VCH-759 * (NNI-site 2)										■	■	■	■		
VCH-916 * (NNI-site 2)										■	■	■	■		
ANA598 ** (NNI-site 3)														■	■
HCV796 * (NNI-site 4)			■	■											
ABT-333 * (NNI-site 4)			■	■											

* Mutations associated with resistance in patients
** Mutations associated with resistance in vitro

Résistance croisée et profils différents selon la classe thérapeutique: combinaison? Avec ou sans IFN?

Preliminary Study of Two Antiviral Agents for Hepatitis C Genotype 1

Anna S. Lok, M.D., David F. Gardiner, M.D., Eric Lawitz, M.D.,
 Claudia Martorell, M.D., Gregory T. Everson, M.D., Reem Ghalib, M.D.,
 Robert Reindollar, M.D., Vinod Rustgi, M.D., Fiona McPhee, Ph.D.,
 Megan Wind-Rotolo, Ph.D., Anna Persson, Ph.D., Kurt Zhu, Ph.D.,
 Dessislava I. Dimitrova, M.D., Timothy Eley, Ph.D., Tong Guo, Ph.D.,
 Dennis M. Grasela, Pharm.D., Ph.D., and Claudio Pasquinelli, M.D., Ph.D.

Patients en échec PR (n=21)

A HCV RNA Levels, Group A

B HCV RNA Levels after Initiation of Rescue Therapy, Group A

C HCV RNA Levels, Group B

Daclastavir (anti-NS5a)
 + Asunaprevir (anti-NS3)
 Pendant S24
 7 échecs sur 11 traités (9 G1a)
 Tous G1a mutants :
 NS5a Q30R, L31M/V, Y93C/N
 NS3 R155K et D168A/E/T/V/Y

Echec Dac+Asu
 Repris +PR
 Rechute++

Dac+Asu+PR
 Pendant S24
 SVR=100% (n=10 dt 9 G1a)

Besoin de PR? Attention au G1a.

Conclusions

L'efficacité du traitement avec IP chez le coinfecté est comparable à celui du mono-infecté, éviter les associations des IP VHC et VIH.

- Attention au VHC détectable, risque de résistance et de rechute.
- L'arrêt du traitement permet le plus souvent aux variants sensibles de redevenir prédominants après de longs mois, restaurant ainsi l'état pré-thérapeutique.
- L'échec thérapeutique et la sélection de variants viraux résistants ne sont pas associés à une aggravation de la maladie hépatique; ces variants restent sensibles au traitement PR.
- Surveillance de la résistance: protocole ANRS GénoR VHC.
- Nouvelles combinaisons et fin de l'interféron ?

FIN

*Bienvenue au
Tonnerre de
BREST 2012*

Victrelis® (bocéprévir) 13 juillet 2011 : Schémas thérapeutiques de l'AMM chez les patients VHC G1

université
de bretagne
occidentale

Patient naïf
tout stade de
fibrose (sauf F4)

Patient en échec
à un précédent
traitement
(sauf répondeur
nul et F4)

Patient F4
Répondeur nul
à un précédent
traitement

* Règle d'arrêt de la trithérapie en fonction du taux d'ARN-VHC
Si ARN-VHC $\geq$ 100 UI/ml à S12
Si ARN-VHC détectable à S24

†Ribavirine 800-1400 mg/j
Victrelis® mentions légales complètes Juillet 2011

Incivo® (télaprévir) 19 septembre 2011 : Schémas thérapeutiques de l'AMM chez les patients VHC G1

université
de bretagne
occidentale

Patient naïf et RR
tout stade de
fibrose (sauf F4)

Patient F4
Répondeur
partiel ou nul
à un précédent
traitement

* Règle d'arrêt de la trithérapie en fonction du taux d'ARN-VHC

Si ARN-VHC $\geq$ 1000 UI/ml à S4 ou S12

† Ribavirine 800-1400 mg/j

Incivo® mentions légales complètes Sept 2011