


Données épidémiologiques du COREVIH Bretagne 2016

Département du Morbihan

Bretagne 2016 (1)


Répartition de la file active au 31/12/2016

Département	Ville	File Active
Finistère	Brest Mal Inf	282
	Brest Med Int	205
	Quimper	420
	Morlaix	40
Ille et Vilaine	Rennes	1383
	St Malo	71
Côtes d'Armor	St Brieuc	407
Morbihan	Vannes	359
	Lorient	285
	Région	3452




Bretagne 2016 (2)

Répartition de la file active au 31/12/2016



Augmentation FA 2015-2016:


- +3,9% Morbihan
- +2% Bretagne



Morbihan 2016

Evolution de la File Active 2010- 2016

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vannes	289	309	330	335	360	358	359
Lorient	229	228	248	223	243	262	285
Morbihan	518	537	578	558	603	620	644
Variation		3,7%	7,6%	-3,5%	8,1%	2,8%	3,9%




Mise en
place de
nadis

Augmentation de
la FA depuis 2010:
+24,3%


Présentation générale des données

Répartition des patients

	File Active	Nouveaux Patients	Nouveaux Dépistés	Déjà suivis en 2015	Patients décédés
Vannes	359	15	7	337	1
Lorient	285	18	6	261	2
Morbihan	644	33	13	598	3




3 décès



Age de la FA (1)

		[15-29]	[30-39]	[40-49]	[50-59]	[60-69]	[70-79]	[80 et plus]	Total
Femmes	%	6,01%	14,75%	34,43%	24,04%	13,66%	6,01%	1,09%	100,00%
Hommes	%	3,46%	9,74%	27,27%	37,88%	14,72%	6,06%	0,87%	100,00%
Total	%	4,19%	11,16%	29,30%	33,95%	14,42%	6,05%	0,93%	100,00%




Moyenne: 51 ans
Médiane: 51 ans
Min- max: [19-86] ans

Hommes majoritaires dans la tranche [50-59]
Femmes majoritaires dans la tranche [40-49]

Age de la FA (2)


Répartition des patients âgés de plus de 50 ans



Ancienneté du diagnostic


Durée de suivi des patients depuis la découverte de la pathologie

Max: 33 ans
Moyenne: 15,4 ans
Médiane: 15 ans




Stade de la maladie

Répartition par stade




Mode de contamination (1)

Hommes



Mode de contamination (2)

Femmes




Infections opportunistes

7 patients

- 2 Candidoses œsophagiennes
- 1 Pneumonie à *Pneumocystis carinii*
- 1 Toxoplasmose cérébrale
- 1 Tuberculose disséminée
- 3 Lymphomes
- 1 Toxoplasmose pulmonaire


Evolution immunologique

Répartition selon le taux de CD4 au 31/12/2016




Evolution virologique

Répartition selon l'ARN VIH au 31/12/2016




Traitements ARV (1)

Evolution 2010-2015 du statut thérapeutique des patients dans le Morbihan




Traitements ARV (2)

Statut des patients au 31/12/2016




Traitements ARV (3)

Evolution 2011-2015 du type de thérapies dans le Morbihan




Traitements ARV (4)

Répartition par type de thérapies au 31/12/2016




Traitements ARV (5)

Evolution 2012-2015 du types de trithérapies dans le Morbihan



Traitements ARV (6)



Répartition par types de trithérapies au 31/12/2016



Associations de traitements au 31/12/2016

Vannes

Bretagne




- 60 lignes de traitements différentes
- Les 10 associations les plus prescrites:
 - 83% des patients traités (291 patients)

- 366 lignes de traitements différentes
- Les 10 associations les plus prescrites:
 - 74,4% des patients traités (2476 patients)

Les mono comprimés (1)

Evolution 2011-2015 des mono comprimés dans le Morbihan




Les mono comprimés (2)

Répartition des monocomprimés au 31/12/2016


Prescription de
mono comprimés:

- **Vannes:**
59,5% de la FA traitée
- **Bretagne:**
56,1% de la FA traitée




Inauguration de traitements (1)

Evolution 2012-2015 du types de trithérapies dans le Morbihan



Inauguration de traitements (2)



Répartition par types de trithérapies en 2016



Inauguration de traitements (3)

Vannes

Bretagne




- 4 lignes de traitements différentes
 - 3,4 % des patients traités (10 patients)

- 14 lignes de traitements différentes
 - 4,2% des patients traités (103 patients)


Efficacité des traitements (1)


Taux de CD4 des patients traités depuis plus de 6 mois au 31/12/2016



Efficacité des traitements (2)

Charge virale HIV des patients traités depuis plus de 6 mois au 31/12/2016







Hépatites

Vannes

Statut sérologique VHB

File active vannetaise au 31/12/2016




Environ 1/3 des patients sont à vacciner
(33,7% à Vannes vs 28,3% en Bretagne)

Co-infections VIH/VHB/VHC

Répartition des hépatites à Vannes au 31/12/ 2016

HEPATITE	N
VHB	13
VHC	57
VHC&VHB	5
Total général	75



75 patients coinfectés:
➤ 20,1% de la FA vannetaise

+3/4 des patients co- infectés
sont VHC+


Co-infections VIH/VHB

- 5% de la FA vannetaise (18 pts)
- 3,4% (12 pts) ont une hépatite active (Ag Hbs+) vs 3,35% pour la Bretagne
 - Tous sont traités par bithérapie
 - 55,6% ont une CV VHB < 20
 - 11,1% CV VHB > 20
 - 33,3% CV non renseignée dans nadis

Co-infections VIH/VHC (1)

Répartition par mode de contamination au 31/12/2016

- 17,3% de la FA vannetaise (62 patients)
(12,8% pour la Bretagne)




Co-infections VIH/VHC (2)

Les traitements au 31/12/2016


- 72,6% des patients VHC+ (45 patients) ont été traités (65,7% pour la Bretagne),
- 29% d'entre eux (13 patients) ont eu un traitement initié en 2016

Co-infections VIH/VHC (3)

Réponse au dernier évènement thérapeutique



Naïfs de tout traitement



Co- infection VIH/VHC (4)

13 patients
traités en
2016

11 HARVONI

1 DAKLINZA+ SOVALDI

1 EXVIERA+VIEKIRAX

- 12 réponses virologiques
- 1 rechuteur

Les nouvelles découvertes (1)

Caractéristiques sociodémographiques des nouveaux dépistés en 2016

- 13 nouveaux dépistés, 2% de la FA du Morbihan
(2,4% pour la Bretagne)
- 100% d'hommes
- [19-66] ans
- Moyenne= 40,2 ans
- Médiane= 35 ans

Age

• 15-29	3	23,08%
• 30-39	4	30,77%
• 40-49	2	15,38%
• 50-59	2	15,38%
• 60-69	2	15,38%

Les nouvelles découvertes (2)

Origine	N	%
FRANCE	11	84,6%
AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE	1	7,7%
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD	1	7,7%
Total général	13	100,0%

48,1% pour la Bretagne

Mode de contamination	Morbihan (H)		Bretagne (H/F)	Bretagne (H)
Hétérosexuel	3	23,1%	35,06%	10,9%
Homo/bisexuel	8	61,5%	45,45%	63,6%
Inconnu	2	15,4%	15,58%	20%
Total général	13	100,00%		


Les nouvelles découvertes (3)

Stade de découverte	N	%
tardive (stade SIDA ou CD4<200)	3	23,1%
précoce (Primo ou CD4>500)	8	61,5%
autre stade de découverte	2	15,4%
	13	100,0%

Niveau immunitaire à la découverte	Total général	
CD4_DEPISTAGE	N	P
<200	3	23,1%
200-350	3	23,1%
>500	3	23,1%
NR	4	30,8%
Total	13	100,0%



Procréation



Enquête Périnatale Française

Etude observationnelle ouverte depuis 2011

Femmes enceintes infectées par le VIH-1 et/ou le VIH-2, désirant accoucher dans l'une des maternités participant à l'enquête. L'inclusion a lieu à l'issue.

- Surveiller, à partir du nombre le plus large possible d'enfants nés de mères séropositives, l'évolution du taux de transmission et des pratiques préventives en France
- Repérer la survenue de toxicité chez les enfants exposés en période périnatale aux antirétroviraux.



Au 31/12/2016 25 inclusions dans le Morbihan, pour 31 accouchements (80,6%)

Mortalité

**26 décès en
Bretagne en
2016**

**3 décès dans le
Morbihan**

- 1 Vannes
- 2 Lorient (dont 1 nouvelle découverte)

**Causes de
décès**

- 1 lymphome anal
- 1 cancer poumon
- 1 insuffisance cardiaque

**Habitudes de
vie**

- 3 buveurs
- 2 fumeurs
- 1 ex fumeur


Education thérapeutique (1)

2016

- 644 patients
 - 68 ont été vus en ETP (10,6% de la FA totale)
 - Moyenne de 2,1 séances/patient
- 52 patients ont été vus pour la 1^{ère} fois (76,5% de la FA ETP)
 - 6 nouveaux dépistés (46,2% des nouvelles découvertes)


Education thérapeutique (2)

Evolution ETP du Morbihan 2011- 2016




Données médico- sociales (1)

Nombre de patients vus/ FA totale en 2016



Données médico- sociales (2)

Nombre de séances/ Patient



Merci de votre attention

